

LEGENDA PER LE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE DI STADIO I-III

Forza di raccomandazione	Descrizione	Espressione
A	Forte raccomandazione	Raccomandiamo (↑↑) Raccomandiamo di non (↓↓)
B	Raccomandazione	Suggeriamo di (↑) Suggeriamo di non (↓)
0	Raccomandazione aperta	Può essere considerato (↔)

Forza di consenso	Descrizione
Consenso unanime	Accordo di 100 % dei partecipanti
Forte consenso	Accordo di > 95 % dei partecipanti
Consenso	Accordo di 75 – 95 % dei partecipanti
Maggioranza semplice	Accordo di 50 – 74 % dei partecipanti
Nessun consenso	Accordo di <50 % dei partecipanti

Referenza bibliografica

German Association of the Scientific Medical Societies (AWMF) & Standing Guidelines Commission (2012) AWMF Guidance Manual and Rules for Guideline Development. [WWW document]. URL <http://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk.html>

Intervento terapeutico: Controllo del biofilm dentale sopragengivale (professionale)

R. 4.14 Qual è il valore della rimozione professionale meccanica della placca come parte della terapia parodontale di supporto?

Raccomandazione basata sul consenso degli esperti
Suggeriamo di eseguire la periodica rimozione meccanica professionale della placca (PMPR) per limitare il tasso di perdita dei denti e fornire stabilità / miglioramento parodontale, come parte di un programma di terapia parodontale di supporto.
<i>Letteratura di supporto</i> (Trombelli et al., 2015)
<i>Grado di raccomandazione</i> Grado B - ↑
<i>Forza del consenso</i> Forte consenso [l'1.4% del gruppo si è astenuto a causa di un potenziale conflitto di interessi (CoI)]

R. 4.15 Nella terapia parodontale di supporto si dovrebbero usare metodi alternativi per la rimozione professionale meccanica della placca?

Raccomandazione basata sull'evidenza
Suggeriamo di non sostituire la convenzionale rimozione meccanica professionale della placca (PMPR) con l'uso di sistemi alternativi (ad es., trattamenti con laser YAG), nella terapia parodontale di supporto.
<i>Letteratura di supporto</i> (Trombelli et al., 2020)
<i>Qualità delle prove d'evidenza</i> 1 RCT
<i>Grado di raccomandazione</i> Grado B – ↓
<i>Forza del consenso</i> Forte consenso [l'1.4% del gruppo si è astenuto a causa di un potenziale conflitto di interessi (CoI)]

R. 4. 16 Nella terapia parodontale di supporto si dovrebbero usare metodi aggiuntivi per la rimozione professionale meccanica della placca?

Raccomandazione basata sull' evidenza
Suggeriamo di non usare metodiche aggiuntive (doxiciclina in dose sub-antimicrobica, terapia fotodinamica) alla rimozione professionale della placca meccanica (PMPR) in terapia parodontale di supporto.
<i>Letteratura di supporto</i> (Trombelli et al., 2020)
<i>Qualità delle prove di evidenza</i> 2 RCT
<i>Grado di raccomandazione</i> Grado B – ↓
<i>Forza del consenso</i> Forte consenso [il 2.7% del gruppo si è astenuto a causa di un potenziale conflitto di interessi (CoI)]

R. 4. 17 Nella terapia parodontale di supporto, qual è il valore del controllo dei fattori di rischio?

Raccomandazione basata sul consenso degli esperti
Raccomandiamo interventi per la riduzione dei fattori di rischio durante la terapia parodontale di supporto.
<i>Letteratura di supporto</i> (Ramseier et al., 2020)
<i>Grado di raccomandazione</i> Grado A – ↑↑
<i>Forza del consenso</i> Forte consenso [0% del gruppo astenuto a causa di un potenziale conflitto di interessi (CoI)]